

Myxomatose bij veldhazen verspreidt zich verder in Duitsland

Bron: [DJV](#)

22. Augustus 2025 (DJV) Berlijn

Het aantal geïnfecteerde dieren in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein neemt snel toe. DJV vraagt om zieke dieren te verwijderen, meer aandacht te besteden aan wild en vondsten te melden via de [dierenvind-kadaster-app](#).

Let op: myxomatose. Meld dode veldhazen via [de kadaster-app](#) voor dieren. (Bron: Grell/DJV)

Myxomatose bij veldhazen komt sinds half augustus 2024 steeds vaker voor in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, sinds juli van dit jaar is ook Sleeswijk-Holstein getroffen. De ziekte wordt veroorzaakt door het myxomavirus uit de familie van de pokkenvirussen. Het wordt overgedragen door steken en lichaamsvloeistoffen. Tot nu toe werd de ziekte als konijnenspecifiek beschouwd en werd slechts sporadisch bij veldhazen aangetroffen.

De incubatietijd is slechts een paar dagen en resulteert in een zeer hoog sterftecijfer van ongeveer 80 procent. Typische symptomen zijn sterk beperkt vluchtgedrag, apathie, bloeddoorlopen, etterend ontstoken ogen en zwelling van het genitale gebied.

Om
de
ve
rs
pr

ei
di
ng
va
n
my
xo
ma
to
se
zo
ve
el
mo
ge
li
jk
te
be
pe
rk
en
,
vr
aa
gt
de
Du
it
se
ja
ch
tv
er
en
ig
in



g
(D
JV
)
om
zi
ek
e
ko
ni
jn
en
te
ve
rw
ij
de
re
n.
Ja
ge
rs
mo
et
en
vo
or
al
op
va
ll
en
d
wi
ld
,
zi

ek
e
of
ge
dr
ag
sm
at
ig
e
ve
ld
ha
ze
n
le
tt
en
,
vo
or
al
in
ge
bi
ed
en
di
e
no
g
ni
et
zi
jn
ge
tr

of
fe
n.
Zi
ch
tb
aa
r
er
ns
ti
g
zi
ek
e
di
er
en
mo
ge
n
oo
k
bu
it
en
de
re
gu
li
er
e
ja
ch
tp
er
io

de
wo
rd
en
ve
rw
ij
de
rd
in
he
t
ka
de
r
va
n
he
t
ne
er
sc
hi
et
en
va
n
he
t
om
on
no
di
g
li
jd
en

te
vo
or
ko
me
n.
Ov
er
lo
de
di
er
en
mo
et
en
vo
or
on
de
rz
oe
k
wo
rd
en
ge
br
ac
ht
na
ar
de
be
vo
eg
de

ve
te
ri
na
ir
e
di
en
st
of
op
de
ju
is
te
ma
ni
er
wo
rd
en
ve
rw
ij
de
rd
.
De
ka
da
ve
rs
mo
ge
n
in
ge

en
ge
va
l
op
en
in
he
t
te
rr
it
or
iu
m
bl
ij
ve
n
of
na
ar
Lu
de
r-
pl
aa
ts
en
wo
rd
en
ge
br
ac
ht
.

He
t
is
vo
or
al
be
la
ng
ri
jk
om
kl
ed
in
g,
sc
ho
en
en
en
ja
ch
tu
it
ru
st
in
g
na
ee
n
ve
rb
li
jf
in

ge
tr
of
fe
n
ge
bi
ed
en
gr
on
di
g
te
re
in
ig
en
en
te
de
si
nf
ec
te
re
n
om
ve
rs
pr
ei
di
ng
va
n
he

t
vi
ru
s
te
vo
or
ko
me
n.

De DJV raadt aan om geen konijnenjacht te houden in gebieden waar steeds meer wild voorkomt. In gebieden met fazanten moeten drijfjachten tot vier weken na het laatste optreden van myxomatose rusten om de onrust tijdens de epidemiefase te minimaliseren. Hondenwerk aan de haas en het doorgeven van sleepwild uit de getroffen gebieden moeten worden vermeden. Gebiedseigenaren met een stabiele konijnen en een laag aantal gevallen wild kunnen de jacht voortzetten.

Het registreren van indicatoren is erg belangrijk voor het detecteren van inbraken bij konijnen. De DJV vraagt daarom alle jagers om vooral op dode veldhazen te letten en zieke en gedode dieren in te schrijven in het [dierenkadaster](#) – met foto en het vermoeden van myxomatose in het commentaarveld. Gebruik hiervoor de [Dierfund-Kadaster-App](#). Elk afzonderlijk bericht helpt om de omvang en het verloop van de epidemie op een wetenschappelijk onderbouwde manier te kunnen begrijpen. Een zo volledig mogelijke registratie is essentieel om de verspreiding van myxomatose op regionaal en nationaal niveau beter te kunnen beoordelen en passende maatregelen te kunnen nemen.