

Myxomatose verspreidt zich snel bij de bruine haas in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen in Duitsland.

Het aantal besmette dieren in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen neemt snel toe. DJV vraagt □□dat zieke dieren worden afgevoerd en dat er meer aandacht wordt besteed aan gevallen wild. De jacht moet in de getroffen gebieden worden opgeschort, evenals het hondenwerk.

Sinds half augustus van dit jaar zijn er steeds meer gevallen van myxomatose bij bruine hazen in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De incubatietijd bedraagt □□slechts enkele dagen en resulteert in een zeer hoog sterftecijfer van 80 procent.

Het Federal Research Institute for Animal Health (FLI) verwacht dat het virus zich snel en verreikend zal verspreiden, ook naar andere deelstaten. Om de verspreiding van myxomatose zoveel mogelijk te beperken, adviseert de Duitse Jachtvereniging (DJV) om zieke konijnen en hazen te verwijderen en op dood wild te letten. Dode dieren moeten voor onderzoek naar het verantwoordelijke staatsbureau worden gebracht of onschadelijk worden verwijderd. Zieke dieren zijn apathisch en vertonen zwellingen en afscheiding uit de ogen en het genitale gebied.

De DJV adviseert de jacht op hazen te vermijden in gebieden waar steeds meer gevallen wild voorkomt. In gebieden met fazanten moet de jacht worden opgeschort totdat een periode van vier weken is verstreken sinds de laatste verschijning van zieke hazen – om het alarm tijdens de epidemische fase tot een minimum te beperken. In getroffen gebieden moet hondenwerk op hazen en het doorgeven van gesleept wild worden vermeden.

Gebiedseigenaren die stabiele hazenpopulaties en onopvallende aantallen gevallen wild registreren, kunnen doorgaan met jagen. Om eventuele achteruitgang van de hazenpopulaties te kunnen volgen, is een regelmatige hazentelling essentieel.

De FLI probeert momenteel uit te vinden of stekende insecten het virus kunnen overbrengen. Ook wordt onderzocht of het om zich heen grijpende virus dezelfde stam is die de afgelopen decennia verantwoordelijk is geweest voor geïsoleerde infecties bij bruine hazen in Frankrijk, Ierland, Groot-Brittannië en Spanje. De toenmalige onderzoeken bevestigden voor het eerst een myxomatosevariant die ook bruine hazen kan infecteren. In 1952 werden in een park in de buurt van Parijs wilde konijnen opzettelijk besmet met het myxomavirus om de schade aan de landbouw tot een minimum te beperken. Als gevolg hiervan kelderden de wilde konijnenpopulaties in heel Europa.